Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

ESTUDIO SOBRE ACTITUDES Y PRACTICAS DE LAS FARMACIAS EN RELACIÓN A LA DISPENSACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS

SECFEC
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

INFORME DE RESULTADOS

SIGMADOS

Julio 2015

Metodología

Encuesta de opinión mediante entrevista telefónica (sistema CATI)

El universo al que se dirige el estudio es el conjunto de las **oficinas de farmacia** en el conjunto del territorio **nacional**.

807 entrevistas

Margen de error de ±3,45% para datos globales para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y una distribución poblacional de p/q=50/50

Muestra nacional con distribución aproporcional: afijación de 150 entrevistas en las CCAA de Andalucía, Cataluña, Madrid y C. Valenciana y el resto de manera proporcional en el resto de Comunidades.

Cuestionario estructurado, con **30 preguntas**

Trabajo de campo realizado del 7 al 14 de julio de 2015

Informantes: Titulares de farmacia, facultativos sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares

Para el análisis de datos globales se devolvió a cada CCAA su peso real en el conjunto de la población.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

SEC SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

ÍNDICE

4
Anticoncepción Hormonal

34
Doble Método

39
Anticoncepción de Urgencia

60
Interesados en recibir formación

62
cuestionario

Anticoncepción Hormonal

De las siguientes vías de administración de anticonceptivos hormonales ¿cuales considera usted las principales? (Respuesta múltiple)



La **vía oral** es, en opinión de los farmacéuticos españoles, la principal vía de administración de anticonceptivos hormonales.

El 94,1% de los farmacéuticos señala la vía oral como la más importante vía de administración, y el 29,4% apunta también la importancia de la administración vía vaginal.

La vía oral es considerada con claridad la vía principal de administración en todos los casos, siempre por encima del 90%. Pero la referencia a la vía vaginal supera el tercio farmacéuticos en Cataluña (36%), y su mención es más frecuente entre los facultativos sustitutos o adjuntos (33,2%).

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Oral (píldora)	94,1%	93,3%	91,9%	97,0%	94,7%	94,6%	92,3%	97,7%
Vaginal (anillo)	29,4%	31,3%	28,8%	33,2%	24,7%	26,5%	33,9%	27,7%
Cutánea (parche)	5,3%	6,7%	6,3%	4,5%	4,4%	6,2%	5,7%	2,1%
Uterina (DIU)	4,2%	4,0%	5,7%	3,3%	1,9%	4,3%	5,5%	0,6%
Subcutánea (implante)	1,9%	1,3%	1,5%	2,8%	1,3%	1,9%	2,3%	1,0%
Intramuscular	0,7%		0,2%	1,0%	1,2%	0,5%	0,8%	0,7%
Otros	0,3%		0,2%	0,3%	0,6%	0,2%	0,3%	0,5%
Ns/Nc	0,8%	1,3%	1,3%		0,7%	0,8%	0,7%	

Si alguna cliente le pregunta por la posibilidad de usar algún método anticonceptivo hormonal, ¿cuál es su respuesta más habitual?



Ante una consulta de alguna cliente sobre la posibilidad de usar algún método anticonceptivo hormonal, la mayoría de los farmacéuticos **lo aconseja pero al mismo tiempo anima a su cliente a acudir al médico antes de iniciar cualquier tratamiento.**

El 60,3% de los farmacéuticos aconseja el uso de anticonceptivos hormonales previa consulta al médico.

El 38,5% de los farmacéuticos se muestra más neutral en su labor de atención farmacéutica, al no ofrecer a las clientes su opinión y aconsejar directamente acudir al especialista a informarse.

Por último, sólo el 0,7% de los farmacéuticos adopta una posición activa para desaconsejar el uso de métodos anticonceptivos hormonales.

Si alguna cliente le pregunta por la posibilidad de usar algún método anticonceptivo hormonal, ¿cuál es su respuesta más habitual?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Se lo aconseja pero la anima a acudir a su médico para que inicie el tratamiento	60,3%	50,0%	58,2%	65,4%	57,0%	58,4%	63,8%	56,6%
No le da su opinión pero le aconseja ir al especialista para informarse	38,5%	48,7%	39,6%	34,2%	43,0%	40,7%	35,2%	41,8%
De entrada, se lo desaconseja	0,7%	0,7%	1,2%	0,5%		1,0%	0,8%	
NS/NC	0,5%	0,7%	1,0%				0,2%	1,6%

La postura de **aconsejar el uso de anticonceptivos hormonales al tiempo que animar a acudir al médico antes de iniciar cualquier tratamiento, es mayoritaria en todos los casos, especialmente en Andalucía (63,2%) y Cataluña (62%).**

Esta actitud es más habitual entre los facultativos sustitutos o adjuntos (65,4%) que entre los titulares de farmacia (58,2%).

La postura de no ofrecer a las clientes su opinión y aconsejar directamente acudir al especialista a informarse se acentúa en la Comunidad Valenciana (48,7%) y entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia (43%).

En general, ¿cuál es su opinión sobre la anticoncepción hormonal?



Al margen de cual sea su postura en la labor informativa respecto al uso de anticonceptivos hormonales, la mayoría de los farmacéuticos la considera **un método seguro y eficaz.**

El 68,7% de los farmacéuticos está de acuerdo en considera la anticoncepción hormonal un método seguro y eficaz.

El 17,3% de los farmacéuticos considera la anticoncepción hormonal una prescripción médica como otra cualquiera.

El 11,7% considera que hay métodos mejores o que incluso no es aconsejable al ser poco natural.

En general, ¿cuál es su opinión sobre la anticoncepción hormonal?

3. En general, ¿cuál es su opinión sobre la anticoncepción hormonal?		COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Es un método seguro y eficaz	68,7%	68,7%	65,9%	73,4%	68,1%	65,9%	70,7%	74,0%
Es una prescripción médica como otra cualquiera	17,3%	18,0%	18,5%	16,3%	15,9%	17,8%	17,0%	15,2%
Hay métodos mejores	7,0%	4,0%	8,0%	4,9%	8,3%	8,7%	5,4%	6,3%
No es un método aconsejable porque es poco natural	4,7%	6,0%	5,1%	3,3%	5,8%	5,2%	4,2%	3,1%
NS/NC	2,3%	3,3%	2,6%	2,1%	1,9%	2,4%	2,7%	1,4%

La consideración de la anticoncepción hormonal como un método seguro y eficaz es **mayoritaria en todos los casos, especialmente entre los farmacéuticos de Cataluña (81,3%).**

Si bien es una opinión mayoritaria entre los distintos profesionales que atienden a los clientes en las farmacias, dicha opinión es más habitual entre los facultativos sustitutos o adjuntos (73,4%) que entre los titulares de farmacia (65,9%).

La opinión según la cual se considera la anticoncepción hormonal una prescripción médica como otra cualquiera encuentra más arraigo en el Resto de Comunidades de España (20,3%), así como en Madrid (19,6%).

La opinión de que hay métodos mejores se registra con algo más de frecuencia en Andalucía 8,6%, y entre los técnicos, auxiliares y ayudantes de farmacia (8,3%).

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Pensando específicamente en las píldoras anticonceptivas: Cuando usted no tiene la píldora anticonceptiva que le pide un cliente en su farmacia, ¿cuál es su respuesta más habitual?



En caso de no tener la píldora anticonceptiva que le pide un cliente, una amplia mayoría de los farmacéuticos la encarga si es posible tenerla en el plazo que su cliente necesita, pero casi un tercio dispensa otra píldora.

El 67,1% de los farmacéuticos encarga la píldora que su cliente necesita si no la tiene pero pueden distribuírsela en el plazo necesario.

El 29,6% de los farmacéuticos dispensa otra píldora distinta a la que su cliente le pide, si no la tiene. Aunque el 26,7% dispensa otra con igual composición, dosis y pauta de toma.

Pensando específicamente en las píldoras anticonceptivas: Cuando usted no tiene la píldora anticonceptiva que le pide un cliente en su farmacia, ¿cuál es su respuesta más habitual?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Se la encarga, si es posible tenerla en el plazo que el cliente necesita	67,1%	61,3%	67,6%	63,6%	71,8%	72,2%	61,9%	66,4%
Dispensa otra con la misma composición, dosis y pauta de toma	26,7%	32,0%	24,7%	30,7%	24,8%	20,4%	32,6%	29,2%
Dispensa otra con la misma composición y dosis	2,9%	4,0%	3,2%	3,5%	1,3%	3,7%	1,6%	3,5%
Aconseja acudir a otra oficina de farmacia donde la tengan	1,8%	2,0%	2,0%	1,3%	2,2%	2,0%	2,4%	
NS/NC	1,5%	0,7%	2,5%	1,0%		1,7%	1,6%	1,0%

La repuesta de encargar la píldora anticonceptiva si es posible tenerla en el plazo que su cliente necesita es **mayoritaria en todos los casos, especialmente entre los farmacéuticos de Madrid (68,6%) y Resto (72%).**

Aunque se trata de una respuesta mayoritaria entre los distintos profesionales que atienden a los clientes en las farmacias, resulta algo más más frecuente entre los los técnicos, auxiliares y ayudantes de farmacia (71,88%).

La dispensación de otra píldora con características similares a la solicitada por un cliente es una práctica que gana frecuencia en Andalucía (34,9%).

Si un cliente le solicita información sobre cómo actuar en caso de olvido de una toma de su tratamiento anticonceptivo, ¿cuál es su respuesta?



En caso de que un cliente solicite información sobre cómo actuar en caso de olvido de una toma de su tratamiento la gran mayoría de farmacéuticos le informaría sobre como actuar .

El 89,8% de los farmacéuticos informarían sobre cómo actual en caso de olvido de una toma del tratamiento anticonceptivo, si el cliente les consulta.

El 7,9% de los farmacéuticos remitiría a su cliente a que se informara con algún profesional sanitario: médico de AP, ginecólogo, matrona, etc..

Si un cliente le solicita información sobre cómo actuar en caso de olvido de una toma de su tratamiento anticonceptivo, ¿cuál es su respuesta?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Le informa usted personalmente	89,8%	87,3%	91,2%	94,0%	79,7%	86,2%	93,3%	93,9%
Le remite a su médico de atención primaria o ginecología	6,0%	5,3%	5,2%	3,4%	12,4%	8,3%	4,0%	3,6%
Nunca le piden esta información	2,1%	2,7%	1,8%	1,6%	3,6%	3,0%	0,7%	0,7%
Le remite a su matrona	1,0%	3,3%	0,9%	0,3%	2,3%	1,6%	0,6%	0,7%
Le remite a otro profesional sanitario	0,9%	1,3%	0,7%	0,5%	2,0%	0,4%	1,4%	1,1%
NS/NC	0,2%		0,2%	0,3%		0,4%		

La actitud de informar personalmente al cliente sobre cómo actuar al haber olvidado una toma de su tratamiento anticonceptivo es **ampliamente mayoritaria en todos los casos, superando el 90% en Cataluña, Andalucía y Resto.**

La respuesta de remitir al cliente a un profesional sanitario es mas frecuente entre los técnicos, auxiliares y ayudantes de farmacia (16,7%).

Si una cliente le informa que la píldora anticonceptiva que toma le está sentando mal, ¿cuál es su respuesta?



Ante una situación en la que una cliente le informa que la píldora que esta tomando le está sentando mal, la mayoría de los farmacéutico la aconsejaría acudir a su prescriptor antes de suspender o cambiar el tratamiento.

Por otra parte, más de un tercio de los farmacéuticos tomaría la iniciativa de aconsejar suspender el tratamiento, aunque este consejo iría acompañado del de consultar con su médico.

En caso de problemas, el 62,4% de los farmacéuticos aconseja acudir al profesional sanitario que le prescribió la píldora antes de tomar cualquier decisión de suspender o cambiar el tratamiento.

Si una cliente le informa que la píldora anticonceptiva que toma le está sentando mal, ¿cuál es su respuesta?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Le aconseja acudir a su prescriptor antes de suspender o cambiar el tratamiento	62,4%	59,3%	63,7%	61,6%	60,4%	64,4%	64,9%	53,8%
Aconseja su suspensión y consultar con su médico	33,0%	36,0%	31,8%	33,7%	34,8%	33,1%	30,1%	38,1%
Le tranquiliza y le aconseja cambiar de método anticonceptivo	2,4%	1,3%	1,6%	3,2%	3,0%	0,7%	2,4%	5,3%
Le tranquiliza y anima a seguir su toma hasta la próxima revisión	1,1%	0,7%	1,1%	0,6%	1,8%	1,0%	0,6%	2,4%
NS/NC	1,2%	2,7%	1,8%	1,0%		0,8%	2,0%	0,5%

La orientación hacia el profesional sanitario que haya prescrito el tratamiento, en caso de que experimente algún malestar, es la respuesta mayoritaria en todos los caso, en especial entre los farmacéuticos de Andalucía (67,1%).

La iniciativa de sugerir la suspensión o cambio del tratamiento es más frecuentes en Cataluña (39,3%), entre los los técnicos, auxiliares y ayudantes de farmacia (34,8%), así como en las farmacias con más empleados (38,1%).

¿Considera usted que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta la incidencia de alguna de las siguientes enfermedades? (Respuesta múltiple)





El 57,8% de los farmacéuticos considera que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta la incidencia de alguna enfermedad.

El 25,9% de los farmacéuticos considera que la píldora anticonceptiva no tiene incidencia alguna sobre ninguna enfermedad.

La incidencia que en mayor medida se asocia al consumo de la píldora anticonceptiva es en relación a trombosis y accidentes cardiovasculares (50,6%).

El 16,3% de los farmacéuticos no sabe o al menos no responde sobre la posible incidencia de nuevas enfermedades por el consumo de la píldora anticonceptiva.

¿Considera usted que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta la incidencia de alguna de las siguientes enfermedades? (Respuesta múltiple)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Trombosis y accidentes cardiovasculares	50,6%	50,7%	52,2%	54,5%	40,2%	47,0%	53,4%	53,0%
No tiene ninguna incidencia	25,9%	25,3%	22,7%	24,0%	37,1%	28,9%	23,0%	25,6%
Cáncer de mama	9,6%	6,7%	7,7%	14,4%	6,3%	9,3%	7,7%	13,5%
Cáncer de útero	7,3%	9,3%	6,4%	10,2%	4,8%	8,1%	6,6%	6,6%
Cancer de ovario	6,2%	6,0%	5,4%	8,4%	4,4%	6,4%	7,1%	2,9%
Otras enfermedades	4,1%	1,3%	5,3%	4,1%	1,2%	5,6%	3,5%	2,0%
NS/NC	16,3%	20,0%	19,7%	10,7%	17,2%	15,5%	18,3%	13,2%
Si tiene alguna incidencia	57,8%	54,7%	57,6%	65,3%	45,7%	55,6%	58,7%	61,2%

Los farmacéuticos de Madrid son los que en mayor medida consideran que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta la incidencia de alguna enfermedad (65,4%).

La opinión de que el uso de la píldora anticonceptiva **no tiene ninguna incidencia** es la más extendida entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia (37,1%).

La enfermedad sobre la que se estima mayor incidencia en todos los casos es la trombosis y los accidentes cardiovasculares, opinión que se eleva al 56,2% entre los farmacéuticos de Madrid.

La falta de respuesta sobre esta cuestión se aproxima al 20% entre los titulares de farmacia.

¿Cree usted que hay diferencias sensibles entre una píldora combinada y otra con sólo gestágenos?



El 70,2% de los farmacéuticos considera que hay diferencias sensibles entre una píldora combinada y otra sólo con gestágenos.

La percepción de estas diferencias es mayoritaria en todos los casos, pero se acentúa en Madrid (77,1%) y entre los facultativos sustitutos o adjuntos (81,3%).

El 14,2% de los farmacéuticos no sabe si hay diferencias sensibles entre una píldora combinada y otra sólo con gestágenos.

Esta circunstancia se eleva al 18,7% entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, y llega al 25,2% entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Sí	70,2%	64,0%	68,4%	81,3%	56,4%	67,7%	71,8%	75,2%
No	15,5%	17,3%	17,5%	10,9%	18,4%	16,6%	13,2%	16,8%
Ns/Nc	14,2%	18,7%	14,1%	7,9%	25,2%	15,7%	14,9%	8,0%

¿Qué le parecería a usted que las píldoras anticonceptivas se pudieran vender sin receta médica?



La mayoría de los farmacéuticos no cree que sea adecuado vender las píldoras anticonceptivas sin receta médica.

A menos de una cuarta parte le parece bien que se puedan dispensar sin receta, mientras que para el 7,7% es una cuestión indiferente.

El 66,5% de los farmacéuticos considera que no es adecuado vender píldoras anticonceptivas sin receta.

¿Qué le parecería a usted que las píldoras anticonceptivas se pudieran vender sin receta médica?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Le parece bien	23,5%	24,0%	25,8%	16,2%	30,1%	22,1%	19,8%	36,0%
No lo cree adecuado	66,5%	68,0%	62,6%	76,2%	60,2%	69,5%	67,9%	56,6%
Le es indiferente	7,7%	6,7%	9,4%	6,5%	5,7%	6,9%	9,3%	5,1%
NS/NC	2,2%	1,3%	2,2%	1,1%	4,0%	1,6%	3,0%	2,3%

En todos los casos es mayoritaria la opinión de que la dispensación de píldoras anticonceptivas sin receta no es adecuada, hecho que se acentúa en Andalucía (70,4%) y entre los facultativos sustitutos adjuntos (76,2%).

La actitud favorable a una venta sin necesidad de receta médica se incrementa en Cataluña (28%), entre los técnicos, auxiliares o ayudantes (30,1%) y en las farmacias con mayor número de empleados (36%).

Y pensando sólo en las píldoras de anticoncepción hormonal combinada ¿cree usted que hay diferencias sensibles entre una u otra píldora?



El 67,7% de los farmacéuticos considera que hay diferencias sensibles entre distintas píldoras combinadas.

La percepción de estas diferencias es mayoritaria en todos los casos, pero se acentúa en Resto de España (73%) y entre los facultativos sustitutos o adjuntos (76%).

El 9,2% de los farmacéuticos no sabe si hay diferencias sensibles entre distintas píldoras combinadas.

Esta circunstancia se eleva al 14% entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana y se sitúa en el 20,4% entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Sí	67,7%	52,7%	65,4%	76,0%	59,9%	66,8%	67,4%	73,4%
No	23,1%	33,3%	26,4%	20,1%	19,7%	22,6%	22,8%	22,0%
Ns/Nc	9,2%	14,0%	8,2%	3,9%	20,4%	10,6%	9,9%	4,6%

En su opinión, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente de la píldora hormonal combinada?



El 76,4% de los farmacéuticos destaca algún efecto secundario frecuente como consecuencia del uso de la píldora hormonal combinada.

El 14,9% de los farmacéuticos considera que la píldora anticonceptiva prácticamente no tiene efectos secundarios sensibles y un 8,6% no se manifiesta al respecto.

El efecto secundario que con más frecuencia asocian los farmacéuticos al consumo de píldoras hormonales combinada es la retención de líquidos (33,1%).

En segundo lugar se menciona que su consumo engorda (17,8%) y en tercer lugar, un 5,7% de farmacéuticos, mencionan las nauseas y vómitos.

En su opinión, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente de la píldora hormonal combinada?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Retención de líquidos	33,1%	32,0%	32,4%	32,7%	35,6%	35,8%	30,1%	30,8%
Engordar	17,8%	16,7%	17,1%	16,6%	21,2%	17,4%	17,6%	20,1%
Prácticamente no tiene efectos secundarios sensibles	14,9%	15,3%	17,1%	14,3%	10,3%	13,2%	18,3%	12,3%
Náuseas, vómitos	5,7%	6,7%	5,2%	7,5%	4,2%	7,0%	4,7%	4,0%
Disminución de la libido	5,4%	3,3%	3,7%	8,0%	5,5%	2,9%	5,0%	13,1%
Aumento de los sangrados intermenstruales	5,2%	6,0%	5,1%	4,6%	6,6%	5,2%	6,5%	2,4%
Dolor mamario	3,6%	2,7%	3,0%	4,6%	3,5%	4,0%	3,3%	3,6%
Otro	5,6%	5,3%	5,2%	4,3%	8,7%	4,8%	6,6%	5,6%
NS/NC	8,6%	12,0%	11,1%	7,3%	4,5%	9,6%	7,9%	8,0%
Mencionan efecto secundario	76,4%	72,7%	71,7%	78,3%	85,3%	77,1%	73,8%	79,6%

Los farmacéuticos de Andalucía (83,5%) y Madrid (80,3%) son los que en mayor medida mencionan efectos secundarios derivados del consumo de la píldora hormonal combinada.

La opinión de que el uso de este tipo de píldora anticonceptiva **apenas tiene efectos secundarios sensibles** se encuentra más extendida entre los titulares de farmacia (17,1%).

El síntoma citado como más frecuente en todos los casos es la retención de líquidos, opinión que se eleva al 46% entre los farmacéuticos de Cataluña.

La falta de respuesta sobre esta cuestión se sitúa en el 12% entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana.

Pensando en la forma de administración ¿qué tipo de píldora anticonceptiva cree usted que es la que más se prescribe?



Según los farmacéuticos, la forma de administración prescrita más habitualmente es de 21 días, pero la diferencia se encuentra en si se prescribe con placebo o sin él.

El 72,6% de los farmacéuticos considera que la forma de administración de la píldora anticonceptiva que más se prescribe es la toma diaria durante 21 días con otros 7 de placebo.

El 22,8% de los farmacéuticos considera que la forma de administración más prescrita es de 21 días y 7 de descanso pero sin placebo.

Pensando en la forma de administración ¿qué tipo de píldora anticonceptiva cree usted que es la que más se prescribe?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Toma diaria 21 días y 7 de placebo	72,6%	74,0%	71,8%	69,0%	80,4%	75,7%	72,7%	66,0%
Toma diaria 21 días y 7 de descanso sin placebo	22,8%	14,7%	23,6%	25,7%	15,8%	20,1%	22,4%	29,2%
Toma diaria 24 días y 4 de placebo	1,9%	4,0%	1,3%	2,5%	2,1%	1,2%	2,0%	3,6%
Toma diaria 22 días y 2 de placebo	0,5%	0,7%	1,1%			0,6%	0,8%	
NS/NC	2,2%	6,7%	2,1%	2,8%	1,8%	2,4%	2,1%	1,3%

La toma diaria durante 21 días seguida de 7 días de placebo es la que en todos los casos se considera que más se prescribe, opinión que alcanza su máximo valor en Andalucía (77,6%) y entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia (80,4%).

La percepción de la administración de la píldora durante 21 días, con descanso de 7 pero sin placebo, se incrementa entre los farmacéuticos de Cataluña (26%).

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

Son desaconsejables en mujeres fumadoras de más de 35 años



El **78%** de los farmacéuticos considera **desaconsejable el uso de anticoncepción hormonal en mujeres fumadoras de más de 35 años.**

Esta opinión se acentúa entre los farmacéuticos de Resto de España (84,2%).

Por el contrario, el 15% de los farmacéuticos no esta de acuerdo en que sea desaconsejable.

Esta circunstancia se eleva al 22,4% entre los farmacéuticos de la Comunidad andaluza y al 22% en la C. Valenciana.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	78,0%	69,3%	79,7%	78,9%	72,0%	74,6%	80,7%	81,4%
En desacuerdo	15,5%	22,0%	13,2%	15,6%	21,2%	17,8%	13,5%	13,3%
NS/NC	6,5%	8,7%	7,1%	5,5%	6,8%	7,6%	5,8%	5,3%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

Hay compuestos hormonales sin estrógenos



El **65,4%** de los farmacéuticos piensa **que hay compuestos hormonales sin estrógenos.**

Esta opinión se acentúa entre los farmacéuticos de Cataluña (73,3%).

Por el contrario, el 18,7% de los farmacéuticos cree que no hay compuestos hormonales sin estrógenos, y además un 15,8% no tiene una opinión al respecto.

La opinión de que no hay compuestos hormonales sin estrógenos se eleva al 25% entre los farmacéuticos de Andalucía.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	65,4%	60,0%	64,3%	69,6%	61,1%	62,1%	65,6%	75,9%
En desacuerdo	18,7%	22,0%	19,0%	17,5%	20,3%	20,0%	19,3%	11,3%
NS/NC	15,8%	18,0%	16,7%	12,9%	18,6%	17,9%	15,1%	12,8%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones



El **62,8%** de los farmacéuticos piensa **el uso de anticoncepción hormonal tiene efectos beneficiosos además de la anticoncepción.**

Esta opinión se acentúa entre los farmacéuticos de Resto de España (67,1%), y es mantenida con mayor frecuencia entre los facultativos sustitutos o adjuntos (67,2%).

Por el contrario, el 35,8% de los farmacéuticos cree que el uso de estos métodos anticonceptivos no aporta otros efectos beneficiosos.

La opinión de que no comportan otros efectos beneficiosos se eleva por encima del 40% entre los farmacéuticos de Andalucía y Cataluña.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	62,8%	61,3%	59,6%	67,2%	63,3%	62,0%	64,0%	64,1%
En desacuerdo	35,8%	36,7%	39,1%	31,9%	33,9%	36,4%	34,3%	35,9%
NS/NC	1,4%	2,0%	1,2%	0,9%	2,8%	1,5%	1,7%	

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

Prácticamente no tienen contraindicación en población sana sin antecedentes trombóticos



El **62,7%** de los farmacéuticos considera que el uso de métodos anticonceptivos hormonales **prácticamente no tienen contraindicación en población sana sin antecedentes trombóticos.**

Esta opinión cuenta con más adeptos entre los farmacéuticos de Madrid (65,4%) y Resto de España (66,3%), y en función de su cargo, es una opinión más frecuente entre los titulares de la farmacia (67,2%).

El 29,7% de los farmacéuticos no está de acuerdo con que la anticoncepción hormonal no presente contraindicaciones en personas sanas sin antecedentes de problemas trombóticos.

Esta opinión se eleva al 38% entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	62,7%	54,7%	67,2%	58,2%	59,2%	64,5%	61,8%	63,0%
En desacuerdo	29,7%	38,0%	25,2%	36,3%	30,2%	26,9%	31,9%	30,1%
NS/NC	7,5%	7,3%	7,7%	5,5%	10,6%	8,6%	6,2%	6,8%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

Tiene efectos secundarios desaconsejables



El **55%** de los farmacéuticos considera que el uso de métodos anticonceptivos hormonales **tiene efectos desaconsejables .**

Sin embargo, el 40,6% de los farmacéuticos piensa que estos métodos no tienen efectos secundarios.

Esta opinión se amplia hasta el 62,7% de los farmacéuticos en Madrid, y se trata de una opinión más frecuente entre los técnicos, auxiliares o ayudantes (61,4%) que entre los titulares de farmacia (50,6%).

La opinión de que los métodos hormonales no tienen efectos secundarios desaconsejables cobra mayor dimensión entre los farmacéuticos de Andalucía y Resto de España, así como entre los titulares de las farmacias.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	55,0%	56,0%	50,6%	57,7%	61,4%	55,2%	55,2%	51,0%
En desacuerdo	40,6%	38,0%	44,0%	40,0%	32,8%	39,6%	39,9%	47,1%
NS/NC	4,5%	6,0%	5,4%	2,3%	5,8%	5,3%	4,8%	1,9%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

El **51,3%** de los farmacéuticos **no aconsejaría el uso de anticonceptivos hormonales a menores de 18 años.**

Por el contrario, el 42% de los farmacéuticos no plantearía problemas al uso de estos métodos hormonales entre menores de 18 años

Esta actitud es mayoritaria en todas las zonas y entre todo tipo de personal de la farmacia.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	51,3%	52,7%	50,0%	52,7%	52,0%	54,8%	46,5%	53,2%
En desacuerdo	42,0%	36,0%	41,2%	42,4%	43,4%	39,4%	46,4%	38,7%
NS/NC	6,7%	11,3%	8,8%	4,9%	4,6%	5,8%	7,1%	8,1%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

No se puede tomar después de los 40 años



El 29,3% de los farmacéuticos considera que no se pueden utilizar métodos de anticoncepción hormonal después de los 40 años.

Esta opinión se acentúa entre los farmacéuticos de Madrid (32,7%).

El **62,9%** de los farmacéuticos **no cree que no se pueda utilizar anticoncepción hormonal después de los 40 años de edad.**

Esta circunstancia se sitúa en torno al 64% entre los farmacéuticos de Andalucía y Resto de España.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	29,3%	28,7%	28,9%	31,3%	27,2%	28,3%	28,3%	34,7%
En desacuerdo	62,9%	62,7%	63,5%	63,3%	61,0%	64,3%	61,7%	61,3%
NS/NC	7,7%	8,7%	7,6%	5,5%	11,8%	7,4%	10,0%	4,0%

Pensando en los métodos de anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

El principal problema es que engorda



El 23,1% de los farmacéuticos coincide en considerar que el principal problema de la anticoncepción hormonal es que engorda.

La importancia otorgada al efecto de engordar como principal problema derivado del uso de anticonceptivos hormonales se incrementa en Madrid (28,8%) y entre los técnicos, auxiliares o ayudantes (26,5%).

La mayoría de los farmacéuticos **(74,2%) no esta de acuerdo en considerar que el principal problema del uso de anticoncepción hormonal sea su efecto sobre el peso**

Se trata de una opinión ampliamente mayoritaria en todos los casos, especialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
De acuerdo	23,1%	17,3%	23,6%	20,2%	26,5%	23,2%	24,6%	19,6%
En desacuerdo	74,2%	78,0%	71,8%	79,6%	71,3%	73,9%	73,0%	77,9%
NS/NC	2,7%	4,7%	4,6%	0,2%	2,1%	2,9%	2,4%	2,5%

Doble Método

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Si un cliente le pregunta en qué consiste el doble método anticonceptivo, ¿usted cómo se lo explica?



Si un cliente pregunta en qué consiste el doble método anticonceptivo, una pequeña mayoría de los farmacéuticos explicarían de forma precisa y correcta en que consiste.

El **58,3% de los farmacéuticos explicaría que el doble método consiste en la utilización a la vez de preservativo y otro método anticonceptivo**.

Sin embargo:

- El 21,7% no lo explicaría de forma correcta.
- El 11,3% reconoce que no lo conoce exactamente.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Si un cliente le pregunta en qué consiste el doble método anticonceptivo, ¿usted como se lo explica?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Usar preservativo a la vez que otro método anticonceptivo: píldora, DIU, Implante, etc...	58,3%	55,3%	58,1%	63,2%	50,7%	57,3%	58,8%	59,5%
Usar dos métodos contraceptivos a la vez: píldora-DIU, DIU-Implante, preservativo-DIU, etc...	12,8%	8,7%	12,9%	14,8%	9,3%	11,3%	12,8%	18,1%
No conozco exactamente en qué consiste	11,3%	11,3%	10,9%	11,1%	12,8%	13,6%	11,1%	6,0%
Usar varios métodos anticonceptivos alternativamente	5,7%	6,0%	4,2%	4,6%	11,6%	6,3%	5,3%	6,0%
Usar cualquier método contraceptivo y la píldora poscoital	0,6%	1,3%	0,4%	0,8%	0,8%	1,0%	0,2%	0,7%
Otras respuestas	2,6%	6,7%	3,2%	1,8%	2,6%	2,5%	3,0%	1,7%
NS/NC	8,6%	10,7%	10,4%	3,8%	12,1%	8,1%	8,9%	7,9%
Explicación incorrecta	21,7%	22,7%	20,7%	22,0%	24,3%	21,1%	21,3%	26,5%

En todos los casos es mayoritaria la explicación correcta del uso del doble método.

La explicación incorrecta del doble método es mayor en Cataluña (26,7%).

En Andalucía es donde en mayor medida reconocen no conocer exactamente en qué consiste el doble método (17,1%).

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Aconseja usted a los clientes de anticonceptivos de su farmacia el uso del doble método? (Base: quienes explican en qué consiste el doble método)



En general, los farmacéuticos no mantienen una iniciativa activa en lo que respecta a aconsejar a sus clientes el uso del doble método, aunque un 4,6% lo hace siempre.

El **32,4% nunca toma la iniciativa** de aconsejar el doble método y el **29,3% sólo lo hace si le preguntan.**

El 31,7% de los farmacéuticos condiciona su consejo a la edad del cliente y la confianza que tenga con él (20,5%) o al tipo de anticonceptivos que compra (11,2%).

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Aconseja usted a los clientes de anticonceptivos de su farmacia el uso del doble método? (Base: quienes explican en qué consiste el doble método)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
No, nunca	32,4%	40,6%	36,2%	26,2%	33,5%	31,1%	36,8%	25,6%
Sólo si me preguntan	29,3%	24,8%	29,0%	26,6%	34,5%	28,4%	28,5%	34,0%
Depende de quién sea el cliente (edad, confianza, etc.)	20,5%	18,8%	17,6%	25,3%	19,8%	22,3%	18,4%	21,0%
Depende del tipo de anticonceptivo que compre/utilice	11,2%	9,8%	9,0%	16,1%	8,2%	10,7%	10,2%	15,8%
Sí, siempre	4,6%	1,5%	6,1%	3,8%	2,0%	5,9%	4,3%	1,7%
NS/NC	2,1%	4,5%	2,1%	2,0%	2,0%	1,6%	1,8%	1,9%

La postura de **no aconsejar nunca el uso del doble método** es la más frecuente entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana (40'6%), Cataluña (38,5%) y Resto de España (30,7%), así como entre los titulares de farmacia (36,2%) y las farmacias con menos de 6 empleados.

La postura de **aconsejar sobre el uso del doble método sólo si le preguntan,** es la más frecuente entre los farmacéuticos de Andalucía (35,7%) y Madrid (33,3%), así como entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia (34,5%) y en las farmacias con mayor número de empleados (34%).



Anticoncepción de Urgencia

Cuando algún cliente le pide anticoncepción de urgencia, ¿cómo se suelen refieren a ella?



De acuerdo a la experiencia de los farmacéuticos entre los clientes la idea de anticoncepción de urgencia está ampliamente ligada al concepto de "píldora del día después".

El 91,1% de los farmacéuticos indica que cuando algún cliente acude solicitando anticoncepción de urgencia se refiere a ella como "la píldora del día después".

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	01-mar	04-may	Más de 6
Piden "la píldora del día después"	91,1%	95,3%	90,1%	91,0%	93,6%	90,9%	91,4%	90,9%
Le piden por el nombre de la marca	4,0%	2,0%	4,2%	4,8%	2,0%	3,7%	4,3%	4,2%
Le explican lo ocurrido y le consultan por algún método de anticoncepción de urgencia	3,9%	1,3%	3,9%	4,1%	3,5%	3,9%	3,4%	4,9%
NS/NC	2,2%	1,3%	3,5%	0,9%	0,9%	3,4%	1,5%	

¿Qué métodos de anticoncepción de urgencia conoce? (Respuesta múltiple)



La práctica totalidad de farmacéuticos conoce algún método de anticoncepción de urgencia, conocimiento que se concentra fundamentalmente en la píldora con levonorgestrel.

El **94,2% de los farmacéuticos conoce la píldora con levonorgestrel.**

El resto de métodos de anticoncepción de urgencia cuentan con un nivel de conocimiento sensiblemente menor:

- El 30,2% conoce las píldoras con acetato de ulipristal.
- El 19,2% conoce el DIU de cobre.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Qué métodos de anticoncepción de urgencia conoce?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Píldoras con levonorgestrel	94,2%	92,0%	93,6%	96,4%	92,2%	91,6%	95,8%	98,4%
Píldoras con acetato de ulipristal	30,2%	22,0%	30,4%	32,8%	25,4%	30,4%	24,0%	43,6%
DIU de cobre	19,2%	12,0%	18,3%	19,3%	21,4%	20,6%	15,3%	25,5%
Otro	2,0%	3,3%	2,3%	1,4%	2,0%	2,9%	1,6%	0,5%
Ns/Nc	2,8%	4,7%	2,9%	1,8%	4,1%	3,5%	2,2%	1,6%

El conocimiento de las píldoras con levonorgestrel se sitúa por encima del 90% en todos los casos.

El conocimiento del DIU de cobre como método de anticoncepción de urgencia es más frecuente en Cataluña, donde alcanza al 26% de los farmacéuticos.

El segundo método de anticoncepción de urgencia más conocido en todos los casos es la píldora de acetato ulipristal, que cuenta con el mayor nivel de conocimiento en Andalucía (32,9%) y Cataluña (33,3%)

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Por qué mecanismos considera usted que actúa la anticoncepción de urgencia? (Respuesta múltiple)



La mayoría de los farmacéuticos coincide en que el mecanismo por el que actúa la anticoncepción de urgencia es evitando la implantación.

El **63,5% de los farmacéuticos afirma que el mecanismo de actuación de la anticoncepción de urgencia consiste en evitar la implantación de espermatozoides en el óvulo**

Sin embargo, un **28,6%** menciona otros mecanismos que no son correctos, como el retraso de la ovulación (8,6%) o la inactivación del óvulo si ya se ha producido la ovulación (7,7%), o el desprendimiento del huevo implantado.

Por otra parte, el **13,2%** de los farmacéuticos **afirma desconocer el mecanismo** que opera en la anticoncepción de urgencia.

¿Por qué mecanismos considera usted que actúa la anticoncepción de urgencia?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Evitando la implantación	63,5%	59,3%	65,5%	71,0%	45,9%	61,8%	67,7%	61,5%
Retrasando la ovulación	8,6%	10,0%	8,4%	8,0%	9,8%	9,5%	6,5%	9,4%
Si ha ovulado, inactivando el óvulo	7,7%	7,3%	6,5%	6,7%	12,4%	8,1%	8,4%	4,7%
Provocando el desprendimiento del huevo implantado	7,1%	7,3%	5,0%	8,2%	10,7%	7,5%	6,6%	8,2%
Sobre el moco cervical, dificultando el paso de espermatozoides	4,3%	5,3%	3,4%	5,4%	4,8%	4,9%	4,0%	4,1%
Otro	0,9%	2,0%	0,7%	1,5%	0,4%	0,5%	1,1%	1,2%
NS/NC	13,2%	14,0%	15,1%	4,7%	22,6%	14,9%	11,0%	11,3%

En todos los casos, excepto entre los técnicos, auxiliares o ayudantes, es mayoritaria la identificación de que el mecanismo por el que actúa la anticoncepción de urgencia es evitando la implantación.

El conocimiento de este mecanismo de actuación alcanza su máximo valor entre los farmacéuticos de Andalucía (66,4%), los de Madrid (66,7%), así como entre los facultativos sustitutos o adjuntos.

La mención de otros mecanismos supera el 30% en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, y es más frecuente entre los técnicos, auxiliares o ayudantes de farmacia.

El reconocimiento del desconocimiento del mecanismo por el que actúa la anticoncepción de urgencia se eleva al 22,6% entre técnicos, auxiliares o ayudantes, y es del 15,1% entre titulares de farmacia.

¿Considera usted la anticoncepción de urgencia como un método abortivo?



Una amplia mayoría de los farmacéuticos no considera la anticoncepción de urgencia como un método abortivo.

El 70,7% de los farmacéuticos opina que la anticoncepción de urgencia no es un método abortivo, frente a un 23,4% que sí la califica en esos términos

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Sí	23,4%	27,3%	27,1%	18,6%	21,9%	23,8%	22,8%	22,3%
No	70,7%	64,0%	66,7%	75,2%	73,4%	71,8%	69,7%	73,7%
Ns/Nc	5,9%	8,7%	6,2%	6,2%	4,7%	4,5%	7,5%	4,0%

La opinión de que la anticoncepción de urgencia no es un método abortivo es mayoritaria en todos los casos, llegando al 80,7% en Cataluña.

Por el contrario, la calificación como un método abortivo es más frecuente en Madrid (32,7%) y entre los titulares de farmacia (27,1%)

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Cuál de las siguientes situaciones es más habitual que se produzca tras la toma de anticoncepción de urgencia?



El **68,1%** de los farmacéuticos considera que la situación que con más probabilidad se puede producir tras la toma de anticoncepción de urgencia e **tener un sangrado a las horas o pocos días de la toma.**

- El 18,4% afirma que lo más habitual es tener un sangrado menstrual normal en la fecha en que toque.
- Sólo un 2,7% piensa que tras la toma de anticoncepción de urgencia no se tendrá sangrado en ese periodo menstrual.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

¿Cuál de las siguientes situaciones es más habitual que se produzca tras la toma de anticoncepción de urgencia?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Es muy posible tener un sangrado a las horas o pocos días después de la toma	68,1%	64,7%	68,0%	68,8%	67,5%	68,6%	68,4%	69,0%
Se tendrá un sangrado menstrual normal en la fecha que le toca	18,4%	22,7%	16,5%	22,3%	16,8%	18,9%	18,6%	19,2%
No se tendrá sangrado en ese periodo menstrual	2,7%	1,3%	2,0%	3,6%	2,8%	1,2%	3,8%	3,3%
NS/NC	10,7%	11,3%	13,5%	5,3%	13,0%	11,3%	9,2%	8,5%

En todos los casos es mayoritaria la opinión de que la situación que con más probabilidad se puede producir tras la toma de anticoncepción de urgencia e **tener un sangrado a las horas o pocos días de la toma.**

La opinión de que la situación más habitual es tener un sangrado menstrual normal en la fecha en que toque, se acentúa en la Comunidad valenciana (22,7%)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la dispensación de anticoncepción de urgencia es correcta?



En cuanto a los criterios de dispensación de la anticoncepción de urgencia, los datos obtenidos muestran un importante desconocimiento al respecto.

Sólo el **23,4% de los farmacéuticos sabe que las píldora de Levonogestrel es de libre dispensación pero la de Acetato de Ulipristal no**

La opinión predominante es que ambas píldoras son de libre dispensación (44,6%).

Y por el contrario, el 19,5% piensa que en ambos casos es necesaria prescripción médica

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la dispensación de anticoncepción de urgencia es correcta?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Tanto las píldoras de Levonogestrel como las de Acetato de Ulipristal son de libre dispensación	44,6%	47,3%	43,9%	53,2%	32,1%	39,3%	45,1%	58,3%
La píldora de Levonogestrel es de libre dispensación pero la de Acetato de Ulipristal no	23,4%	21,3%	22,5%	25,8%	21,4%	22,0%	26,6%	20,2%
Las dos necesitan prescripción médica	19,5%	18,7%	17,8%	15,1%	31,0%	23,4%	17,3%	15,7%
La píldora de Acetato de Ulipristal es de libre dispensación pero la de Levonogestrel no	1,1%	0,7%	0,8%	0,9%	2,2%	1,3%	1,1%	0,7%
NS/NC	11,4%	12,0%	15,0%	5,0%	13,2%	13,9%	9,9%	5,2%
Criterio de dispensación incorrecto	65,2%	66,7%	62,5%	69,2%	65,3%	64,0%	63,5%	74,7%

Únicamente en Andalucía (36,2%) es más frecuente la opinión de que **las píldora de Levonogestrel es de libre dispensación pero la de Acetato de Ulipristal no**

El mayor desconocimiento respecto al criterio correcto de dispensación se registra en Madrid (68,7%) y Resto (68%), así como entre los facultativos sustitutos o adjuntos (69,2%).

Por el contrario la afirmación de que ambas píldoras son de libre dispensación se acentúa en la Comunidad Valenciana, Madrid y Resto de España.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Como usted sabe, en España existe la objeción de conciencia a la dispensación de la anticoncepción de urgencia, ¿podría decirme cuál es su posición al respecto?



El **92,1%** de los farmacéuticos dispensa la anticoncepción de urgencia.

- El 71,1% no se plantea ningún problema de objeción y la dispensa.
- El 21% la dispensa aunque no está de acuerdo con ella.

El **4,6%** de los farmacéuticos se declara objetor de conciencia y no dispensar la anticoncepción de urgencia.

Como usted sabe, en España existe la objeción de conciencia a la dispensación de la anticoncepción de urgencia, ¿podría decirme cuál es su posición al respecto?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
No tiene ningún problema de objeción y sí la dispensa	71,1%	70,0%	70,5%	69,8%	74,6%	68,9%	75,0%	71,0%
No está de acuerdo con su uso, pero la dispenso	21,0%	20,0%	20,2%	26,0%	14,5%	21,9%	19,0%	24,5%
Es objetor, no dispensa anticonceptivos de urgencia	4,6%	6,7%	5,9%	2,3%	5,3%	6,7%	2,8%	2,9%
NS/NC	3,4%	3,3%	3,4%	2,0%	5,6%	2,5%	3,2%	1,6%

La ausencia de problemas de objeción para dispensar la anticoncepción de urgencia **se eleva por encima del 80% en Cataluña.**

En Andalucía es donde hay mas farmacéuticos que a pesar de no estar de acuerdo con su uso, dispensan la anticoncepción de emergencia (30,3%).

El mayor nivel de objeción de conciencia en relación a la dispensación de anticoncepción de emergencia se registra en Madrid (11,1%).

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Cuando le solicitan anticoncepción de urgencia ¿qué fármaco recomienda en su farmacia? (Base: Dispensan anticoncepción de urgencia)



Una amplia mayoría de quienes dispensan anticoncepción de urgencia recomiendan Levonorgestrel, lo cual está en clara sintonía con el hecho de ser también el método más conocido.

El **70% de los farmacéuticos recomienda levonorgestrel.**

- El 19,4% no realiza recomendación alguna ni propicia una posible elección por parte del cliente, ya que directamente dispensa el que considera o el que tiene.
- Tan sólo el 4,8% de los farmacéuticos da a elegir entre ambos (Levonorgestrel o Acetato de Ulipristral), si bien hay que recordar que el segundo no es de libre dispensación.

Cuando le solicitan anticoncepción de urgencia ¿qué fármaco recomienda en su farmacia? (Base: Dispensan anticoncepción de urgencia)

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA		CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA		Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Recomiendo Levonorgestrel	70,0%	67,9%		70,1%	71,8%	66,8%	69,6%	70,1%	74,4%
No recomiendo ninguno, directamente dispenso el que yo considero o tengo	19,4%	22,9%		20,6%	17,7%	19,4%	19,7%	21,3%	14,5%
Doy a elegir entre ambos	4,8%	2,1%		3,3%	6,5%	5,8%	4,0%	5,0%	6,3%
Recomiendo Acetato de Ulipristral	1,6%	0,7%		1,4%	2,2%	1,3%	1,6%	0,9%	3,8%
NS/NC	4,1%	6,4%		4,7%	1,8%	6,6%	5,1%	2,8%	1,0%

La recomendación de Levonorgestrel es mayoritaria en todos los casos, registrándose en Cataluña y Andalucía valores superiores al 75%.

La actitud de no realizar recomendación alguna ni dejar a elección del cliente, ya que directamente dispensa el que considera o el que tiene, es más frecuente entre farmacéuticos de la Comunidad Valenciana.

La opción de dar a elegir entre ambos fármacos se incrementa ligeramente en Cataluña(6,1%) y entre los facultativos sustitutos o adjuntos.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Pensando en los casos en los que en su farmacia han solicitado algún método de Anticoncepción de Urgencia, ¿los clientes piden información sobre los efectos secundarios del anticonceptivo de emergencia?



De acuerdo a la experiencia de los farmacéuticos, los clientes que solicitan algún método anticonceptivo de urgencia no suelen preguntar sobre sus efectos secundarios.

El 73,1% de los farmacéuticos indica que es poco o nada frecuente que los clientes que acuden a la farmacia a por anticoncepción de urgencia soliciten información sobre la existencia de efectos secundarios

No obstante, el 15,4% de los farmacéuticos manifiesta que esta petición de información es frecuente, e incluso el 8,3% afirma que siempre se demanda esa información.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Pensando en los casos en los que en su farmacia han solicitado algún método de Anticoncepción de Urgencia ¿los clientes piden información sobre los efectos secundarios del anticonceptivo de emergencia?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Siempre que se demanda	8,3%	8,6%	8,8%	6,8%	9,9%	10,5%	7,3%	5,4%
Frecuentemente	15,4%	7,9%	15,0%	16,9%	13,8%	13,8%	14,9%	21,4%
Pocas veces	37,8%	35,7%	34,5%	45,6%	32,5%	32,6%	40,5%	48,8%
Nunca	35,3%	45,0%	37,7%	29,9%	38,7%	39,6%	35,5%	23,4%
NS/NC	3,1%	2,9%	4,0%	0,8%	5,1%	3,4%	1,9%	1,0%

En todos los casos, la experiencia de los farmacéuticos apunta de forma mayoritaria que, los clientes que solicitan algún método anticonceptivo de urgencia no suelen preguntar sobre sus efectos secundarios.

Esta falta de demanda de información se acentúa en la Comunidad Valenciana, donde el 80,7% de los farmacéuticos afirma que los clientes consultan pocas veces o nunca sobre los efectos secundarios.

Por el contario, en Madrid (30,8%) y Cataluña (27,9%) es donde, según indican los farmacéuticos, la consulta sobre posibles efectos secundarios se lleva a cabo con más frecuencia.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Cuando se dispensa el anticonceptivo de urgencia en su farmacia, ¿aconseja acudir a asesoramiento anticonceptivo?



La actitud más habitual, aunque sin ser mayoritaria, es aconsejar acudir a asesoramiento anticonceptivo a las clientes que solicitan anticoncepción de urgencia.

Siempre que dispensan anticoncepción de urgencia el **40,5% de los farmacéuticos aconseja acudir a asesoramiento anticonceptivo.**

Un 35% de los farmacéuticos realiza esa recomendación sólo de manera ocasional

Y por el contrario, el 21,3% afirma que se limita a dispensar el anticonceptivo sin realizar nunca comentario o consejo alguno.

Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®

Cuando se dispensa el anticonceptivo de urgencia en su farmacia, ¿aconseja acudir a asesoramiento anticonceptivo?

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Siempre	40,5%	42,1%	41,5%	36,2%	45,3%	42,6%	38,8%	41,5%
A veces	35,0%	32,1%	32,9%	38,3%	34,7%	36,2%	31,3%	41,2%
Nunca, sólo se la dispenso sin hacer comentarios	21,3%	20,7%	21,6%	24,0%	16,0%	18,3%	27,3%	16,4%
NS/NC	3,2%	5,0%	4,0%	1,6%	4,0%	3,0%	2,6%	1,0%

En todos los casos la actitud más habitual, sin ser mayoritaria, es aconsejar siempre al cliente de anticoncepción de emergencia acudir a asesoramiento anticonceptivo, excepto en Madrid y Resto de España.

Entre los farmacéuticos de Madrid y Resto de España es más habitual que tal recomer cabo de manera ocasional

En función de su rol en la farmacia, los técnicos, auxiliares o ayudantes son quienes con mayor frecuencia adoptan la postura de aconsejar al cliente acudir a asesoramiento anticonceptivo.

La de lin ensar el anticonceptivo sin realizar nunca comenta alguno es muy similar en todas los zonas.

¿Cuál es su opinión sobre disponer de una píldora del día después en casa?



La practica totalidad de los farmacéuticos se muestra de contrario a que se disponga de una "píldora del día después" en casa de manera preventiva.

El 90% de los farmacéuticos considera que tener una "píldora del día después" en casa es una mala práctica e implica automedicación, opinión que se encuentra ampliamente generalizada en todos los casos.

Por el contrario, el 6,8% piensa que se trata de una buena opción por si se precisa de urgencia en algún momento, opinión que se eleva al 10,7% en Cataluña.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Es una mala práctica, implica automedicación	90,0%	88,0%	88,9%	94,0%	86,0%	91,0%	90,3%	91,6%
Es una buena opción por si se precisa de urgencia en algún momento	6,8%	7,3%	7,1%	4,9%	9,1%	6,6%	7,4%	6,5%
Ns/Nc	3,3%	4,7%	4,1%	1,1%	4,9%	2,4%	2,3%	1,9%

¿Cree que el farmacéutico debe asesorar y aconsejar sobre la toma de anticonceptivo de urgencia?



La práctica totalidad de personal de farmacia es partidario de la labor de asesoramiento y consejo sobre la toma de anticoncepción de urgencia.

El 90% opina que el farmacéutico debe asesorar y aconsejar sobre la toma de anticonceptivos de urgencia.

La actitud favorable a esta labor de asesoramiento al cliente de anticoncepción de urgencia se encuentra ampliamente generalizada en todos los casos, llegando al 83,6% entre los facultativos sustitutos o adjuntos.

Por el contrario, el 7,8% no cree que el farmacéutico deba llevar a cabo una función de consejo o asesoramiento en esta materia, circunstancia que se eleva al 10% en Cataluña

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Sí	90,0%	88,0%	89,4%	93,6%	85,4%	89,0%	92,9%	92,9%
No	7,8%	8,0%	8,9%	5,6%	8,7%	10,2%	6,1%	5,5%
Ns/Nc	2,2%	4,0%	1,7%	0,8%	5,9%	0,8%	1,0%	1,7%

Interesados en Recibir Formación

¿Estaría usted interesado en recibir formación práctica y específica en anticoncepción hormonal?



El 67,9% de los farmacéuticos está interesado en recibir formación práctica y específica en anticoncepción hormonal

Esta actitud favorable a la formación se acentúa en Cataluña (63,3%), Resto de España (70,2%) y entre los facultativos sustitutos o adjuntos (77,9%).

Por el contrario, el 29,3% no se muestra interesado en obtener formación en materia de anticoncepción hormonal.

Esta actitud que se eleva al 39,3% en la Comunidad Valenciana y al 33,3% en Cataluña. Por otra parte, los técnicos, auxiliares o ayudantes son los menos dispuestos a recibir este tipo de formación (44,1%).

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	CARGO			NÚMERO DE EMPLEADOS		
		COMUNIDAD VALENCIANA	Titular de la farmacia	Facultativo sustituto o adjunto	Técnico. auxiliar o ayudante	1-3	4-5	Más de 6
Sí	67,9%	58,0%	68,3%	77,9%	50,2%	67,8%	71,1%	67,7%
No	29,3%	39,3%	29,0%	21,0%	44,1%	30,9%	26,9%	29,6%
Ns/Nc	2,8%	2,7%	2,8%	1,1%	5,7%	1,3%	2,0%	2,8%

Cuestionario

ENCUESTA DE ANTICONCEPCION A FARMACÉUTICOS

Realizada por la empresa **Sigma Dos** para **LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN**

Buenos días/buenas tardes. Soy entrevistador de la empresa Sigma Dos. Estamos llevando a cabo un estudio para la Sociedad Española de Contracepción sobre las opiniones de los farmacéuticos sobre el uso de métodos anticonceptivos en España. Sus respuestas se utilizarán exclusivamente para realizar análisis estadísticos de forma ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales y respetando siempre la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación de Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) y sus modificaciones posteriores

ANTICONCEPCION HORMONAL

1. **¿De las siguientes vías de administración de anticonceptivos hormonales cuales considera usted las principales? (Respuesta múltiple - Rotar)**
   - Oral 1
   - Vaginal 2
   - Cutánea 3
   - Intramuscular 4
   - Uterina 5
   - Subcutánea 6
   - Otros 7
   - Ns/Nc (NO LEER) 9

2. **Si alguna cliente le pregunta por la posibilidad de usar algún método anticonceptivo hormonal, ¿cuál es su respuesta más habitual?**
   - De entrada, se lo desaconseja 1
   - Se lo aconseja pero la anima a acudir a su médico para que inicie el tratamiento 2
   - No le da su opinión pero le aconseja ir al especialista para informarse 3
   - NS/NC (NO LEER) 9

3. **En general, ¿cuál es su opinión sobre la anticoncepción hormonal? (leer opciones -rotar)**
   - Es un método seguro y eficaz 1
   - Hay métodos mejores 2
   - No es un método aconsejable porque es poco natural 3
   - Es una prescripción médica como otra cualquiera 4
   - NS/NC (NO LEER) 9

4. **Pensando específicamente en las píldoras anticonceptivas. Cuando usted no tiene la píldora anticonceptiva que le pide un cliente en su farmacia, ¿cuál es su respuesta más habitual?**

Se la encarga, si es posible tenerla en el plazo que el cliente necesita 1
Aconseja acudir a otra oficina de farmacia donde la tengan 2
Dispensa otra con la misma composición, dosis y pauta de toma 3
Dispensa otra con la misma composición y dosis 4
NS/NC (NO LEER) 9

5. **Si un cliente le solicita información sobre cómo actuar en caso de olvido de una toma de su tratamiento anticonceptivo, ¿cuál es su respuesta?**

Le remite a su médico de atención primaria o ginecología 1
Le remite a su matrona 2
Le remite a otro profesional sanitario 3
Le informa usted personalmente 4
Nunca le piden esta información 5
NS/NC (NO LEER) 9

6. **Si una cliente le informa que la píldora anticonceptiva que toma le está sentando mal, ¿cuál es su respuesta?**

Le tranquiliza y anima a seguir su toma hasta la próxima revisión 1
Aconseja su suspensión y consultar con su médico 2
Le tranquiliza y le aconseja cambiar de método anticonceptivo 3
Le aconseja acudir a su prescriptor antes de suspender o cambiar el tratamiento 4
NS/NC (NO LEER) 9

7. **¿Considera usted que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta la incidencia de alguna de las siguientes enfermedades? (Respuesta múltiple - Rotar)**

Cáncer de mama 1
Cáncer de útero 2
Cáncer de ovario 3
Trombosis y accidentes cardiovasculares 4
Otras enfermedades 5
No tiene ninguna incidencia 6
NS/NC (NO LEER) 9

8. **¿Cree usted que hay diferencias sensibles entre una píldora combinada y otra con sólo gestágenos?**

   Si.....1 No.....2 Ns/Nc (no leer).....9

9. **¿Qué le parecería a usted que las píldoras anticonceptivas se pudieran vender sin receta médica?**

   Le parece bien 1
   No lo cree adecuado 2
   Le es indiferente 3
   NS/NC (NO LEER) 9

10. **Y pensando sólo en las píldoras de anticoncepción hormonal combinada ¿Cree usted que hay diferencias sensibles entre una u otra píldora?**

    Si.....1 No.....2 Ns/Nc (no leer).....9

11. **En su opinión, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente de la píldora hormonal combinada? (UNA SÓLA RESPUESTA)**

    Náuseas, vómitos 1
    Engordar 2
    Disminución de la libido 3
    Aumento de los sangrados intermenstruales 4
    Dolor mamario 5
    Prácticamente no tiene efectos secundarios sensibles..... 6
    Otro..... 7
    NS/NC (NO LEER) 9

12. **Pensando en la forma de administración ¿qué tipo de píldora anticonceptiva cree usted que es la que más se prescribe?**

    Toma diaria 21 días y 7 de placebo 1
    Toma diaria 24 días y 4 de placebo 2
    Toma diaria 21 días y 7 de descanso sin placebo 3
    Toma diaria 22 días y 2 de placebo 4
    NS/NC (NO LEER) 9

Pensando en los métodos a anticoncepción hormonal en general, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

	De acuerdo	En desacuerdo	NS/NC(NO LEER)
1. Tiene efectos secundarios desaconsejables	1	2	0
2. Tiene efectos beneficiosos además de la anticoncepción	1	2	0
3. No la aconsejaría a menores de 18 años	1	2	0
4. El principal problema es que engorda	1	2	0
5. No se puede tomar después de los 40 años	1	2	0
6. Hay compuestos hormonales sin estrógenos	1	2	0
7. Prácticamente no tienen contraindicación en población sana sin antecedentes trombóticos	1	2	0
8. Son desaconsejables en mujeres fumadoras de más de 35 años	1	2	0

DOBLE MÉTODO

13. Si un cliente le pregunta en qué consiste el doble método anticonceptivo, ¿usted como se lo explica?

Usar **preservativo a la vez que otro método anticonceptivo**: píldora, DIU, Implante, etc.... 1
Usar **dos métodos contraceptivos a la vez**: píldora-DIU, DIU-Implante, preservativo-DIU, etc.2
Usar **cualquier método contraceptivo y la píldora poscoital** 3
Usar **varios métodos anticonceptivos alternativamente** 4
Otras respuestas (no leer). 5
No conozco exactamente en qué consiste (Pasar a p.15) 6
NS/NC (NO LEER) 9

14. ¿Aconseja usted a los clientes de anticonceptivos de su farmacia el uso del doble método?

Sí, siempre 1
Sólo si me preguntan 2
Depende de quién sea el cliente (edad, confianza, etc.) 3
Depende del tipo de anticonceptivo que compre/utilice 4
No, nunca 5
NS/NC (NO LEER) 9

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA

15. Cuando algún cliente le pide anticoncepción de urgencia, ¿cómo se suelen refieren a ella?

Piden "la píldora del día después" 1
Le piden por el nombre de la marca 2
Le explican lo ocurrido y le consultan por algún método de anticoncepción de urgencia 3
NS/NC (No leer) 9

16. ¿Qué métodos de anticoncepción de urgencia conoce? (Respuesta Múltiple)

Píldoras con **levonorgestrel** 1
Píldoras con **acetato de ulipristal** 2
DIU de cobre 3
Otro 4
Ns/Nc (no leer) 9

17. ¿Por qué mecanismos considera usted que actúa la anticoncepción de urgencia? (Respuesta múltiple)

Retrasando la ovulación 1
Evitando la implantación 2
Sobre el moco cervical, dificultando el paso de espermatozoides 3
Provocando el desprendimiento del huevo implantado 4
Si ha ovulado, inactivando el óvulo 5
Otro 6
NS/NC (NO LEER) 9

18. ¿Considera usted la anticoncepción de urgencia como un método abortivo?

Si.....1 No.....2 Ns/Nc (no leer).....9

19. ¿Cuál de las siguientes situaciones es más habitual que se produzca tras la toma de anticoncepción de urgencia?

Es muy posible tener un sangrado a las horas o pocos días después de la toma 1
Se tendrá un sangrado menstrual normal en la fecha que le toca 1
No se tendrá sangrado en ese periodo menstrual 3
NS/NC (No leer) 9

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la dispensación de anticoncepción de urgencia es correcta?

Tanto las píldoras de Levonogestrel como las de Acetato de Ulipristal son de libre dispensación ...1
La píldora de Levonogestrel es de libre dispensación pero la de Acetato de Ulipristal no 2
La píldora de Acetato de Ulipristal es de libre dispensación pero la de Levonogstrel no 3
Las dos necesitan prescripción médica.....4
NS/NC (No leer).....9

21. Como usted sabe, en España existe la objeción de conciencia a la dispensación de la anticoncepción de urgencia, ¿podría decirme cuál es su posición al respecto?

Es objetor, no dispensa anticonceptivos de urgencia ..... 1 Pasar a P.25
No tiene ningún problema de objeción y sí la dispensa..... 2
No está de acuerdo con su uso, pero la dispenso 3
NS/NC (No leer) 9

22. Cuando le solicitan anticoncepción de urgencia ¿qué fármaco recomienda en su farmacia?

Recomiendo Levonorgestrel 1
Recomiendo Ac. Ulipristral..... 2
Doy a elegir entre ambos..... 3
No recomiendo ninguno, directamente dispenso el que yo considero o tengo..... 4
NS/NC..... 9

23. Pensando en los casos en los que en su farmacia han solicitado algún método de Anticoncepción de Urgencia ¿los clientes piden información sobre los efectos secundarios del anticonceptivo de emergencia?

Siempre que se demanda 1
Frecuentemente..... 2
Pocas veces..... 3
Nunca 4
NS/NC (No leer) 9

24. Cuando se dispensa el anticonceptivo de urgencia en su farmacia, ¿aconseja acudir a asesoramiento anticonceptivo?

Siempre..... 1
A veces..... 2
Nunca, sólo se la dispenso sin hacer comentarios 3
NS/NC (No leer) 9

25. ¿Cuál es su opinión sobre disponer de una píldora del día después en casa?

Es una buena opción por si se precisa de urgencia en algún momento 1
Es una mala práctica, implica automedicación 2
Ns/Nc 9

26. ¿Cree que el farmacéutico debe asesorar y aconsejar sobre la toma de anticonceptivo de urgencia?

Si.....1 No.....2 Ns/Nc (no leer).....9

GENERALES

27. **¿Estaría usted interesado en recibir formación práctica y específica en anticoncepciòn hormonal?**

Si.....1 No.....2 Ns/Nc (no leer).....9

28. ¿Cuántas personas trabajan en la farmacia?

1-3..... 1
4-5..... 2
Más de 6 3

29. ¿Qué franja horaria atienden en esta farmacia?

Horario comercial habitual (Mañana y tarde) y guardias 1
Horario contínuo (12 h) y guardias 2
Cualquiera de las anteriores opciones sin guardias 3
24 horas todos los días 4
24 horas 5 ó 6 días a la semana 5

30. ¿Cuál es su cargo en la farmacia?

Titular de la farmacia 1
Facultativo sustituto o adjunto 2
Técnico de farmacia 3
Auxiliar de farmacia 4
Ayudante 5
Estudiante en formación (becario) 6
Otros 7